



CARBOCAL

correttore delle fisiopatie da carenza di calcio
uso fogliare
consentito in agricoltura biologica

- LIQUIDO
- APPORTA CALCIO DI PRONTA ASSIMILAZIONE
- AUMENTA LE DIFESE NATURALI DELLA PIANTA
- MIGLIORA LA CONSERVABILITA' POST RACCOLTA DI FRUTTI E FIORI

Composizione

calcio (CaO) 12,5%, acidi organici a basso peso molecolare per assorbimento fogliare

Caratteristiche

CARBOCAL, prodotto liquido a base di calcio legato ad acidi carbossilici a basso peso molecolare.

Il calcio è elemento indispensabile per la crescita della pianta e per la costruzione delle pareti cellulari. E' fondamentale nel conferire resistenza meccanica ai tessuti, nella formazione di steli robusti e nel determinare turgore cellulare. Inoltre migliora il vigore generale della pianta, facilita l'assorbimento di nutrienti e neutralizza le scorie tossiche che si producono durante il metabolismo. Non sempre le piante riescono ad assorbire grandi quantità di calcio dal suolo soprattutto in presenza di pH anomali, di alte temperature e di scarsa disponibilità idrica. Inoltre il calcio è poco mobile motivo per cui la pianta va incontro molto spesso a carenza. Il calcio fornito con Carboval è di immediato assorbimento attraverso le foglie e gli acidi organici a cui è legato lo rendono estremamente mobile e velocemente traslocabile fino ai siti d'azione dove svolge azione preventiva e curativa dei disordini fisiologici dovuti a carenza di calcio:

- butteratura amara del melo
- spaccatura dei frutti su drupacee
- necrosi apicale (tip-burn) su orticole da foglia
- disseccamento del rachide su vite
- cuore nero di sedano e carota
- marciume apicale in pomodoro e altre orticole
- spaccature dei frutti su melone
- bordatura marginale su poinsettia
- spaccature e maculatura degli agrumi

Applicazioni

Su tutte le colture.

Dosi e modalità d'impiego

orticole da frutto	300 - 400 g/hl	fogliare	ripetere ogni 1 - 2 settimane durante la fase di crescita frutto
orticole da foglia	4 kg/ha	fogliare	trattare ogni 15 - 20 giorni
pomacee	3 - 4 kg/ha	fogliare	dall'inizio accrescimento frutti ogni 3 settimane
drupacee	3 - 4 kg/ha	fogliare	ogni 15 giorni durante la crescita dei frutti
vite	3 kg/ha	fogliare	trattare ad acino "grano di pepe" e poi 2 volte ogni 15 - 20 giorni
floricole	400 g/hl	fogliare	applicazioni ogni 1 - 2 settimane durante la crescita vegetativa

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata. Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità

Non miscelare con prodotti contenenti solfati o fosfati. Evitare le miscele con zolfo e rame.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt