



MAIROL S

npk 6-20-30 con microelementi
uso fogliare

- POLVERE
- TOTALMENTE SOLUBILE
- IDEALE PER FLORICOLTURA, ORTICOLTURA, VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA
- AD AZIONE STIMOLANTE
- CONTIENE MAGNESIO
- INCREMENTA IL GRADO ZUCCHERINO

Composizione

azoto (N) totale 6% di cui ammoniacale 1,5%, ureico 4,5%, anidride fosforica (P₂O₅) 20%, ossido di potassio (K₂O) 30%, ossido di magnesio (MgO) 2%, boro (B) 0,06%, cobalto (Co) 0,002%, rame (Cu) chelato 0,02%, manganese (Mn) 0,09%, zinco (Zn) 0,007%

Caratteristiche

MAIROL S, concime in polvere dotato di altissima solubilità. La composizione è caratterizzata dal rapporto npk 1:3:5. L'azoto è fornito in forma ammoniacale ed ureica per un'azione immediata. L'alto valore in fosforo attiva la produzione di energia mediante un aumento dell'attività di ATP. La maggiore energia, a disposizione della pianta, è finalizzata alla formazione di fiori e frutti.

Il surplus di energia permette al potassio di esplicare totalmente la sua azione, assicura l'ideale equilibrio tra produzione di sostanze azotate ed idrati di carbonio, conferisce ai frutti migliore serbevolezza e più intensa colorazione, determina maggiore resistenza delle piante alla siccità e al freddo.

In particolare sulla vite determina un consistente incremento del grado zuccherino e irrobustisce i tessuti in modo da aumentare la resistenza contro la botrytis. La presenza di magnesio favorisce l'attività fotosintetica e previene il disseccamento del rachide.

I microelementi presenti nella formulazione contribuiscono ad attivare tutti i processi vitali della pianta: attivazione degli enzimi, fertilità dei pollini, fissazione dell'azoto, prevenzione delle clorosi.

Applicazioni

Su tutte le colture.

Dosi e modalità d'impiego

| | | | |
|------------|----------------|----------|--|
| orticole | 100 – 150 g/hl | fogliare | ogni 7 giorni da inizio maturazione a completa maturazione |
| frutticole | 150 g/hl | fogliare | durante l'allegagione ripetere ogni 10 giorni fino a completa maturazione dei frutti |
| floricole | 200 g/hl | fogliare | ogni 7 giorni fino alla fioritura |
| vite | 100 - 150 g/hl | fogliare | dall'inviatura alla completa maturazione ogni 10 giorni |

Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità

E' miscibile con tutti gli antiparassitari di uso comune ad eccezione dei prodotti fortemente alcalini.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 25 kg